Réactions acido-basiques

Présenté par: Pr. A. Azzeddine

Sommaire

Les principes théories des acides et des bases.

Les constantes d'équilibres des réactions acide/base.

Classement des couples acide/base et évolution d'une réaction acido-basique.

Calcul de pH de différents types de réactions acido-basique.

Solution tampon

Selon la théorie d'Arrhenius:

Un **acide** est une substance qui, lorsque mise en solution aqueuse, libère des **ions hydrogène** $(H^+)(H^+)$.

Un acide doit donc toujours contenir de l'hydrogène comme source d'ions H^+ .

Une **base** est une substance qui, lorsque mise en solution aqueuse, libère des **ions hydroxyde** $(OH^-)(OH^-)$.

Une base doit donc renfermer des ions hydroxyde OH^-

Selon la théorie d'Arrhenius:

- Un acide HA est une substance qui, en solution aqueuse, fournit, lors de son équilibre de dissociation, des protons H^+ :

- Une base BOH est une substance qui, dans les mêmes conditions, fournit des ions OH^-

Limites de la définition d'Arrhenius

Certains composés comme l'ammoniac ou les amines, qui ne possèdent pas de groupe hydroxyle peuvent former des solutions basiques dans l'eau.

Le cation H^+ ne peut pas exister à l'état libre en solution aqueuse.

La théorie d'Arrhenius considère l'eau comme seul solvant des réactions acide-base alors que d'autres solvants sont possibles

Selon Brønsted-Lowry :

Un acide est une substance
qui peut **céder** un ion H^+
(donneur de proton).

Une base est une substance
qui peut **accepter** un ion H^+
(accepteur de proton)

Réaction entre l'ammoniac et l'eau selon la théorie de Brønsted-Lowry :

Réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau
selon la théorie de Brønsted-Lowry :

Polyacide : espèce susceptible de protoner plusieurs molécules d'eau.

H_2PO_4^- et HPO_4^{2-} jouent le rôle d'un acide et d'une base : **ampholytes**

Polybase : espèce susceptible de déprotomer plusieurs molécules d'eau.

Couples **acide** / **base** dans l'eau

• A tout acide, correspond une base

• L'acide et la base correspondante sont dits conjugués

• Ils forment un couple acide / base noté AH / A-

Un couple AH/A- est aussi représenté par le schéma formel : **AH** $\rightleftharpoons$ **A⁻** + H⁺

Exemples : **HNO₂** / **NO₂⁻** , **NH₄⁺** / **NH₃**

Exemple :

L'eau est
ampholyte

L'eau est la base
conjuguée de
l'ion hydronium

couple
 $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$

L'eau est l'acide
conjugué l'ion
hydroxyde

couple
 $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$

les ions hydroxyde et hydronium sont en équilibre :

Cet équilibre est appelé
équilibre **d'autoprotolyse**
Il est caractérisé par
la constante d'équilibre K_e

La relation traduisant cet équilibre est : $K_e = \frac{a(H_3O^+) \cdot a(OH^-)}{a^2(H_2O)}$

pour les solutions diluées: $a = 1$, $a(H_3O^+) = \frac{[H_3O^+]}{c_0}$ et $a(OH^-) = \frac{[OH^-]}{c_0}$

soit donc : $K_e = \frac{[H_3O^+] \cdot [OH^-]}{1 \cdot c_0^2}$

Ou, plus simplement, en exprimant les concentrations en mol/l :

$$K_e(T) = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$$

K_e , appelée produit ionique, ne dépend que de la température à $T = 25^\circ\text{C}$, $K_e = 10^{-14}$

On définit également pK_e par : $pK_e = -\log K_e$

où $K_e = 10^{-pK_e}$ à $T = 25^\circ\text{C}$: $pK_e = 14$

Définition

On appelle **constante d'acidité d'un couple acide/ base en solution aqueuse**, la constante d'équilibre, notée K_A , associée à l'équation de la réaction qui se produit lors de la mise en solution dans l'eau de l'acide A du couple $A(aq)/B(aq)$. Cette équation d'écrit :

La constante d'acidité a donc comme expression :

$$K_A = \frac{[B]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[A]_{\text{éq}}}$$

Constante d'acidité des couples HA/A :

Pour la réaction acido-basique, d'équation : $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$

En solution aqueuse diluée, la relation à l'équilibre s'écrit :

$$K_A = \frac{a(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot a(\text{A}^-)}{a(\text{AH})}$$

Soit plus simplement, en exprimant les concentrations en mol/l

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

La constant K_A est appelée constante d'acidité du couple HA/A⁻. On définit également :

$$\text{p}K_A = -\log K_A$$

soit $K_A = 10^{-\text{p}K_A}$, K_A et $\text{p}K_A$ ne dépendent que de la température.

Pour la réaction acido-basique, d'équation : $A^- + H_2O = HA + HO^-$

la relation à l'équilibre s'écrit en exprimant les concentrations en mol/l :

$$K_B = \frac{[HA].[HO^-]}{[A^-]}$$

K_B n'est pas indépendante de K_A ; en effet, pour un couple acide – base donné :

$$K_A \cdot K_B = \left(\frac{[H_3O^+].[A^-]}{[AH]} \right) \cdot \left(\frac{[HA].[HO^-]}{[A^-]} \right) = [H_3O^+].[HO^-]$$

soit : $K_B \cdot K_A = [H_3O^+].[HO^-] = K_e(T)$ d'où : $pK_A + pK_B = pK_e$

un couple acide – base peut donc être caractérisé par la seule constante d'acidité K_A ou par le pK_A correspondant

□ Constante d'acidité des couples du solvant eau

➤ Pour le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$: $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+$

$K_A = [\text{H}_3\text{O}^+] / [\text{H}_3\text{O}^+] = 1$ et $\text{p}K_A = 0$ quelle que soit la température.

➤ Pour le couple $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$: $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$

$K_A = [\text{H}_3\text{O}^+].[\text{HO}^-] = K_e$ soit $\text{p}K_A = \text{p}K_e = 14$ à 25°C

A 25°C : $\text{p}K_A(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = 0,0$ et $\text{p}K_B(\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-) = 14$

Classement des couples acide/base et évolution
d'une réaction acido-basique.

Variation de pK_A et/ou K_A en rapport avec la force d'acidité et/ou de basicité

Exemple:

Nom du couple acide/base	Formule	PKa	Ka
Hydronium/eau	H_3O^+/H_2O	0	1
trichloroéthanoïque/trichloroéthanoate	CCl_3COOH/CCl_3COO^-	0,7	0.19
acideiodique/iodate	HIO_3/IO_3^-	0,8	0.15
dichloroéthanoïque/dichloroéthanoate	$CHCl_2COOH/CHCl_2COO^-$	1,26	0.05
fluoroéthanoïque/fluoroéthanoate	CH_2FCOOH/CH_2FCOO^-	2,57	0.0027
chloroéthanoïque/chloroéthanoate	$CH_2ClCOOH/CH_2ClCOO^-$	2,86	0.0014
bromoéthanoïque/bromoéthanoate	$CH_2BrCOOH/CH_2BrCOO^-$	2.90	0.0012
Acide lactique/lactate	$CH_3CHOHCOOH/CH_3CHOHCOO^-$	3,08	0.0008
Acide nitreux/nitrite	HNO_2/NO_2^-	3,14	0.0007 2

On s'appuie sur les valeurs des grandeurs K_a et pK_a pour classer les couples acide-base entre eux :

Plus l'acide est fort, plus la réaction : $AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$ se fait facilement, au détriment de la réaction inverse.

Par conséquent, un acide est d'autant **plus fort** que sa constante d'acidité K_a est **plus grande** donc son pK_a **plus petit**.

Par définition un **acide fort** est un acide **plus fort** que H_3O^+ . Comme le couple (H_3O^+/H_2O) a un pK_a égal à 0, un acide fort aura un pK_a négatif.

Par définition, un **acide faible** est un acide **moins fort** que H_3O^+ . Comme le couple (H_3O^+/H_2O) a un pK_a égal à 0, un acide faible aura un pK_a positif.

Classement des couples acide/base et évolution d'une réaction acido-basique.

		pK_A	
bases fortes dans l'eau	$C_2H_5O^-$		
	OH^-	14,0	C_2H_5OH
bases faibles dans l'eau	NH_3	0,0	H_2O
	CH_3COO^-		NH_4^+
	H_2O	0,0	CH_3COOH
	Cl^-		H_3O^+
	HCl		acides forts dans l'eau

Evolution d'une réaction acido-basique

Sa constante K^0 peut s'exprimer en fonction des constantes d'acidité des deux couples acide1/base1 et acide2/base2 mis en jeu compte tenu des relations vérifiées à l'équilibre :

$$K^0 = \frac{[base1].[acide2]}{[acide1].[base2]} = \frac{[base1].[H_3O^+]}{[acide1]} \cdot \frac{[acide2]}{[H_3O^+].[base2]}$$

Soit
$$K^0 = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{(pk_{A2} - pk_{A1})}$$

Le caractère favorable ($K^0 > 1$) ou non ($K^0 < 1$) de la réaction peut être visualisé à l'aide de représentations graphiques

❖ **Dans le premier cas :**
$$K^0 = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{(pk_{A2} - pk_{A1})} \succ 1$$

La réaction est favorable dans le sens :

Si l'écart des pK_A est suffisant, $pK_{A2} - pK_{A1} \geq 4$;

soit $K^0 > 10^4$: la réaction peut être considérée totale.

❖ **Dans le deuxième cas :**
$$K^0 = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{(pk_{A2} - pk_{A1})} \prec 1$$

la réaction est défavorable dans le sens :

Si l'écart des pK_A est suffisant, $pK_{A1} - pK_{A2} \geq 4$;

soit $K^0 \leq 10^{-4}$: la réaction peut être considérée comme nulle

Calcul de pH de différents types de réactions acido-basique.

❖ Définition du pH : Le pH est une grandeur qui va donner une information sur la comparaison entre les concentrations des ions H_3O^+ et HO^- .

- l'acide conjugué de l'eau est en proportion plus importante que la base conjuguée de l'eau
- Solution dite acide

- la base conjuguée de l'eau est en proportion plus importante que l'acide conjugué de l'eau
- Solution dite basique

- la base conjuguée de l'eau est en proportion égale à l'acide conjugué de l'eau. D'après l'autoprotolyse de l'eau : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$
- Solution dite neutre

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

solutions neutres

- $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$
- **pH = 7,0**

solutions acides

- $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} > [\text{HO}^-]$
- **pH < 7,0**

solutions basiques

- $[\text{HO}^-] > 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} > [\text{H}_3\text{O}^+]$
- **pH > 7,0**

$$0 \leq \text{pH} \leq 14$$

Calcul de pH de différents types de réactions acido-basique.

Utilisation d'indicateurs colorés naturels

- 1767 : W.LEWIS emploie un extrait de tournesol pour quantifier l'acidité.

Papier de tournesol (rouge en milieu acide)

William Lewis (1714 – 1781) :
chimiste et médecin anglais.

Utilisation d'indicateurs colorés naturels

- La couleur du jus du chou rouge change nettement suivant la valeur de pH (rouge au jaune). Cela est dû à un anthocyane

Jus du chou rouge à différents pH

Anthocyane du chou rouge

Utilisation d'indicateurs colorés synthétiques

- L'essor de la chimie organique permet la synthèse d'indicateurs colorés dont les virages (changements de couleur) sont plus réduits ⇒ mesures plus précises

Phénolphaléine

Virage phénolphaléine
(rose : milieu basique)

Utilisation d'indicateurs colorés synthétiques

Indicateur	pK_A	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique
Orange de Méthyle	3,7	rouge	3,2 – 4,4	jaune
Vert de bromocrésol	4,7	jaune	3,8 – 5,4	bleu
Rouge de méthyle	5,1	jaune	4,8 – 6,0	rouge
Bleu de bromothymol	7,0	jaune	6,0 – 7,6	bleu
Rouge de phénol	7,9	jaune	6,8 – 8,4	rouge
Phénolphtaléine	9,4	incoloré	8,2 – 10,0	violet

Utilisation de papier pH contenant des indicateurs colorés. Le papier pH mis en contact de la solution prend une coloration qui dépend du pH.

Nature des électrodes permettant la mesure du pH :

Il faut deux électrodes, une de mesure (électrode de verre) dont le potentiel dépend du pH et une de référence de potentiel constant (électrode au calomel par exemple)

Une électrode de verre auquel il faut associer une électrode de référence

Electrode combinée

1948 : Ingold propose une électrode combinée (comprenant électrode de verre + électrode de référence)

Cas d'un acide faible : Le pH d'une solution **d'acide faible** de concentration apportée c et de constante d'acidité K_A vaut : $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log C_A)$ **si $pK_A + \log c_A \geq 2$**

Cas d'une base faible : Le pH d'une solution de **base faible** de concentration apportée c et de constante d'acidité K_A , vaut : $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A - \log C_A)$ **si $pK_e - pK_A + \log c_A \geq 2$**

Cas d'un acide fort : Pour une solution de monoacide de concentration apportée C : $\text{pH} = -\log c$

Cas d'une base fort : Pour une solution de monobase de concentration apportée C : $\text{pH} = 14 + \log c$

Cas des solution ampholyte : Pour une solution des sels d'acides et bases faibles : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} + \text{pK}_{A2})$

Cas d'acide faible/base conjuguées :

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$$

Solution tampon

Un tampon est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée.

Chaque fois qu'un acide faible est titré par une base, il se forme une solution tampon

Les tampons sont utiles dans tous les types de réaction où l'on désire maintenir le pH à une valeur constante prédéterminée

Le pH d'une solution tampon «acido-basique» est peu sensible à l'addition de petites quantités d'acide ou de base

Le pH est donné par : $\text{pH} = \text{pka} + \log[\text{B}]/[\text{A}]$

il est très facile de suivre l'évolution du pH d'une solution tampon en fonction du rapport $[\text{B}]/[\text{A}]$

Le pH varie peu avec les fluctuations du rapport $[\text{B}]/[\text{A}]$

A photograph of various laboratory glassware including beakers, flasks, and test tubes containing liquids of different colors (green, yellow, orange, purple, red, blue) on a white surface. In the background, a periodic table of elements is visible.

Exemple du mélange tampon :

1- Phosphate monosodique-phosphate disodique: $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} = \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ (pka = 7,2), Si à un tel mélange équimolaire de pH=7,2, on ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à la concentration de 0,1M, le pH devient:

$$\text{pH} = 7.2 + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 7.2 + \log \frac{(1-0.1)}{(1+0.1)} = 7.1$$

2- Si on dissout 0,1mol d'acide fort (acide HCl) dans 1l d'eau pure, alors le pH passe de 7 à 1. En réalisant la même opération non plus dans un litre d'eau, mais dans un litre de solution aqueuse d'acide acétique (CH_3COOH) à 1mole.L^{-1} et d'acétate de sodium ($\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$) à 1mole.L^{-1} , le pH passe de 4,75 à 4,66.

La dilution de cette solution d'acide faible et de sa base conjuguée dans un litre d'eau pure, n'entraîne pas de variation de pH. Cette limitation des variations de pH s'appelle «l'effet Tampon».

Illustration du pouvoir tampon

Faible pouvoir tampon:
l'ajout d'un acide ou
d'une base provoque
une forte variation de pH

Pouvoir tampon élevé:
l'ajout d'un acide ou
d'une base ne provoque pas
ou presque pas
de variation du pH

La **loi de Le Châtelier** explique un tel phénomène: L'ajout d'un acide fort perturbe l'équilibre acido-basique de l'acide faible et de sa base conjuguée. Il y a donc évolution du système vers un nouvel état d'équilibre, s'opposant à la perturbation. Dans le cas présent, la base conjuguée de l'acide faible va consommer les ions hydroniums H_3O^+ , qui ont été ajoutés. Ainsi, l'ajout d'ions hydronium est minimisé.

Pour réaliser une solution tampon de pH donné, il est conseillé de choisir un couple acidobasique de pK voisin du pH recherché. Le mélange acide-base: acide acétique - acétate, convient par exemple dans le cas d'un milieu tamponné à pH=5. A pH=9, on utilise plutôt le couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$.

Solution tampon

Le degré de dissociation : Le degré de dissociation d'un électrolyte (acide, base ou sel) est donné par:

$$\alpha = \frac{\text{nombre de moles dissociés}}{\text{nombre de moles initiales}}$$

- Par « nombre de moles dissociées » on entend le nombre de moles ayant subi
 - ✓ la réaction de dissociation dans le cas d'un acide.
 - ✓ la réaction de dissociation dans le cas d'une base.
 - ✓ la réaction de dissolution avec scission en ions dans le cas d'un sel.
- Par « nombre de moles initiales » on entend le nombre total de moles calculé en supposant qu'il n'y a pas eu d'ionisation.

Exemples d'applications

- ❑ *Le degré de dissociation d'une solution aqueuse de phénol vaut 10^{-4} . Cela veut dire que sur 10000 molécules de phénol introduites initialement dans l'eau, une seule est ionisée, ($\alpha = 1/10000$). Après l'ionisation, on trouvera donc pour 9999 molécules de phénol C_6H_5OH et un seul ion phénolate $C_6H_5O^-$ provenant de la réaction de dissociation acide.*
- ❑ *Le degré de dissociation d'une solution aqueuse d'hydroxylamine vaut 10^{-2} . Cela veut dire que sur 100 molécules d'hydroxylamine introduites initialement dans l'eau, une seule est ionisée, ($\alpha = 1/100$). Après l'ionisation, on trouvera donc pour 99 molécules d'hydroxylamine NH_2OH , un seul ion hydroxyle ammonium NH_3OH^+ provenant de la réaction de dissociation basique.*
- ❑ En divisant dans l'équation précédente le numérateur et le dénominateur par le volume, on obtient:
$$\alpha = \frac{[\text{substance ionisé}]}{[\text{substance}]_0}$$

Exemples d'applications:

- ❑ *Le degré de dissociation d'une solution aqueuse 0,1 molaire de phénol ($[C_6H_5OH]_0 = 0,1 \text{ mol/l}$) vaut 10^{-4} . Cela veut dire que dans cette solution on a: $[C_6H_5O^-] = 10^{-5} \text{ mol/l}$, ($\alpha = 10^{-5}/0,1 = 10^{-4}$)*
- ❑ *Le degré de dissociation d'une solution aqueuse 0,01 molaire d'hydroxylamine ($[NH_2OH]_0 = 0,01 \text{ mol/l}$) vaut 10^{-2} . Cela veut dire que dans cette solution on a: $[NH_3OH^+] = 10^{-4} \text{ mol/l}$, ($\alpha = 10^{-4}/0,01 = 10^{-2}$).*

Signification du degré de dissociation

Comme son nom l'indique, le degré de dissociation mesure jusqu'à quel point une substance est dissociée :

$\alpha = 0$ signifie: pas de dissociation,

$\alpha = 1$ signifie: la dissociation est complète,

$0 \leq \alpha \leq 1$ est le cas général : dissociation partielle,

Le pourcentage de dissociation est donné par $\alpha \times 100$: est le nombre de moles « dissociés » pour 100 moles « initiales »

Cas particuliers:

➤ Acides forts, bases fortes, sels solubles : $\alpha = 1$

➤ Acides faibles : $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{[HA]_0}$ alors $K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{[HA]_0 - [H_3O^+]} = \alpha^2 \frac{[HA]_0^2}{[HA]_0(1-\alpha)}$

D'où : $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{[HA]_0}}$: degré de dissociation des acides faibles, valable si $\frac{K_a}{[HA]_0} \ll 10^{-4}$

➤ Bases faibles : $\alpha = \frac{[OH^-]}{[B]_0}$ alors $K_b = \frac{[OH^-]^2}{[B]_0 - [OH^-]} = \alpha^2 \frac{[B]_0^2}{[B]_0(1-\alpha)}$

D'où : $\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{[B]_0}}$: degré de dissociation des bases faibles, valable si $\frac{K_b}{[B]_0} \ll 10^{-4}$

A photograph of various laboratory glassware including beakers, flasks, and test tubes containing liquids of different colors (green, yellow, orange, purple, blue, red) on a white surface. In the background, a periodic table of elements is visible.

Dépendance du degré d'ionisation de la concentration

Prenons à titre d'exemple un **acide faible** de constante d'acidité K_a :

- Si l'équation $\alpha = (K_a/[AH]_0)^{1/2}$ est valable, alors nous voyons tout de suite qu'une diminution de $[HA]_0$ provoque une augmentation de la fraction $K_a/[AH]_0$, donc de sa racine carrée donc de α
- Si l'équation $K_a = \alpha^2[AH]_0/(1-\alpha)$ est valable, alors la reformulation $K_a/[AH]_0 = \alpha^2/(1-\alpha)$ permet de se rendre compte qu'une diminution de $[HA]_0$ provoque une augmentation de la fraction $K_a/[AH]_0$, donc de $\alpha^2/(1-\alpha)$ ce qui n'est pas possible que si le numérateur de cet dernière fraction augmente ou son dénominateur diminue, donc si α augmente:

Le degré de dissociation augmente, si la concentration diminue

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION